

核准日期：2007年02月09日

发布或修订

日期：2013

年04月27

日


注射用盐酸川芎嗪说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：对本品过敏者禁用。脑出血及有出血倾向者禁用。

【药品名称】	【通用名称】	注射用盐酸川芎嗪
	【商品名】	川青
	【英文名】	Ligustrazine Hydrochloride for Injection
	【汉语拼音】	Zhusheyong Yansuan Chuanxiongqin
【成份】	【化学名称】	2,3,5,6-tetramethylpyrazine hydrochloride

【化学结构式】



【分子式】

$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2 \cdot \text{HCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

【分子量】

208.69

【注射剂辅料】

甘露醇、氯化钠

【性状】 本品为白色或类白色疏松块状物或粉末。

【适应症】 用于缺血性脑血管病，如：脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等。

【规格】 80mg

【用法用量】 用 5%葡萄糖注射液或 0.9% 氯化钠注射液 250ml ~500ml 稀释后缓慢静脉滴注，每次 80mg ~ 120mg，一日一至两次，10 ~15 天为 1 疗程。

【不良反应】 无明显不良反应，个别病例偶有口干、嗜睡等。

【禁忌】 以下患者禁用： 1、对本品过敏者。 2、脑出血及有出血倾向者。

【注意事项】 1、脑水肿者应慎用。 2、不得与碱性药物配伍静注使用。

3、本品静脉滴注速度不宜过快。

4、当药品性状发生改变时：如瓶内有异物、颜色改变请勿使用。

【孕妇及哺乳期

尚不明确。

妇女用药】

【儿童用药】 尚不明确。

【老年用药】 明显心、肝、肾功能减退者酌减量。

【药物相互作用】 尚不明确。

【药物过量】 如出现过量，应采取对症处理，保证生命体征的平稳，给予支持治疗。

【药理毒理】 盐酸川芎嗪对腺苷二磷酸（ADP）、花生四烯酸及 PAF（血小板活化因子）诱导的人血小板聚集有抑制作用，并对已集聚的血小板有解聚作用。此外本品还可扩张小动脉，改善微循环和增加脑血流量。

【药代动力学】 文献资料表明，动物静脉注射本品后，消除半衰期 $t_{1/2\beta}=1.69h$ ，分布半衰期 $t_{1/2\alpha}=0.1441h$ ；药物主要分布于血管丰富的大循环和组织，肝脏含量最高，其它依次为心脏、脾、脑、睾丸、肺、肾、肌肉、血浆；盐酸川芎嗪可通过血脑屏障，它和人血浆和兔血浆蛋白结合率分别为 44.3%和 46.8%；本品在体内分布广，

消除快，肝脏为主要消除器官，肾脏排泄较少。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【包装】 低硼硅玻璃管制注射剂瓶，6支/盒。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 《中国药典》2010年版第二增补本

【批准文号】 国药准字 H20041175

【生产企业】 【企业名称】 哈尔滨三联药业股份有限公司

【注册地址】 哈尔滨市利民开发区北京路

【邮政编码】 150025

【电话号码】 0451-57355668

【传真号码】 0451-57354698

【网址】 www.medisan.com.cn

【企业名称】 哈高科白天鹅药业集团有限公司

【委托生产企业】

【生产地址】 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路4号街区